

# 予防接種

予防接種は町が指定する予防接種実施医療機関で行っています。接種するときは、必ず母子健康手帳を持参してください。  
予防接種の個別案内は行っておりません。また、近年では、お子さんの進学などで予防接種が必要とされる場合が多く、将来のためにも定期接種（無料）であるうちに接種しておくことを推奨します。

- ・接種の際は、体温を測ってください。37.5度以上の場合は受けられません。
- ・予防接種の予診票は、各医療機関に用意してあります。
- ・予防接種に関してご不明な点がございましたら、保健センターまでお問合せください。

※定期接種の費用は無料になりますが、対象月年齢を過ぎてから接種する場合は有料です。

## ■町立中標津病院

受診日 毎週 月・水・金曜日 ※毎月第2金曜日はBCG接種のみ

接種時間 午後3時～午後4時まで ※Webによる完全予約制です。

自動再来機で小児科を受付後、小児科外来窓口に行って下さい。初めて受診される方は、総合窓口で受付が必要です。

●定期接種 (無料)	予防の内容	回数	対象月年齢 (推奨)	補足
BCG	結核	1回	3か月以上～12か月末満	
ポリオ	ポリオ（急性灰白髄炎）による 小児麻痺	I期1回	I期3回目接種後、 1～1年半あけて接種	五種混合ワクチンを接種したお子さんは、 ポリオ・ヒブおよび四種混合の接種は不要です。 なお、ポリオ単独ワクチンを接種する際は、 町立中標津病院にお問い合わせください。
五種混合	百日咳・破傷風 ジフテリア・ポリオ・ヒブ	I期3回	生後2～90か月 初回免疫は 2～12か月まで	
四種混合	百日咳・破傷風 ジフテリア・ポリオ	I期3回		
二種混合	破傷風・ジフテリア	II期1回	11歳以上13歳未満	学校での集団接種。
小児用 肺炎球菌	肺炎球菌による感染症 (細菌性髄膜炎・菌欠症など)	初回3回 追加1回		生後7か月以降に初回接種を開始した場合、 接種回数が変わります。
ヒブ	ヒブによる感染症 (細菌性髄膜炎・菌欠症など)	初回3回 追加1回	2か月以上5歳未満	ご不明な点は、保健センターにお問い合わせ下さい。
日本脳炎	-	I期3回 II期1回	6か月以上7歳6か月末満 9歳以上13歳未満	I期初期（2回）：3歳～4歳未満 I期追加（1回）：4歳～5歳未満 II期：9歳以上10歳未満
みずぼうそう	-	2回	1歳以上～3歳未満	3ヶ月以上間隔をおく
B型肝炎	B型肝炎ウイルスによる感染症	3回	生後1歳まで	生後2か月～9か月推奨
ロタウイルス	ロタウイルスによる感染症	ロタリックス 2回 ロタテック 3回	生後6週～24週 生後6週～32週	1回目は生後14週6日までに受けてください。

●任意接種 (有料)	予防の内容	回数	対象月年齢 (推奨)	補足
おたふくかぜ	-	2回	1歳以上	日本小児学会では2回の接種を推奨しています。
インフルエンザ	-	2回 1回	6か月以上13歳未満 13歳以上	